



**«Консолидация усилий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции
среди различных групп населения»**

РЕЗОЛЮЦИЯ

Стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией до 2020 года

- 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус;
- 90% людей, знающих о своем позитивном ВИЧ-статусе, должны получать лечение;
- 90% людей, получающих лечение, должны иметь подавленную вирусную нагрузку.

Тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Сахалинской области

- смещение заражения ВИЧ в старшие возрастные группы – 30-40 лет и 40-50 лет;
- рост парентерального «наркотического» пути передачи ВИЧ-инфекции (2014 г. – 33,3%);
- феминизация эпидемии ВИЧ-инфекции, возрастает доля женщин репродуктивного возраста в общей когорте инфицированных – 43,4% (РФ – 36,9%).

**ПУТИ достижения цели – снижение распространения ВИЧ инфекции,
предупреждение смертей, обусловленных СПИДом**

- выявление ВИЧ-инфекции у контингентов УФСИН и УВД (ИВС);
- выявление ВИЧ-инфекции среди всех наркопотребителей, потребителей психоактивных веществ, состоящих на учете, поступающих в РАО и терапевтические отделения с отравлениями;
- выявление ВИЧ-инфекции среди пациентов с ИППП, наличие которых указывает на практику незащищенных половых контактов и партнеров беременных;
- Снижение заболеваемости и числа смертей, в том числе от туберкулёза, который является основной причиной смерти;
- продолжение работы с учащейся молодежью по формированию менее опасного поведения в отношении заражения ВИЧ и наркопотребления, применение технологии «равный – равному»;
- внедрение программ профилактики ВИЧ-инфекции на рабочем месте.

Благодаря имеющимся инструментам, в настоящее время имеется реальная возможность сдерживания распространения и создания условий для снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения Сахалинской области.